

REGISTRO SENASA: F.03.70.N.1879

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

USO VETERINARIO

POLVO

COMPOSICIÓN

Tilosina tartrato.....	50 g
Doxiciclina.....	200 g
Excipiente c.s.p.....	1000 g



PROPIEDADES

BRONCOX D® es una combinación de dos antibióticos bacteriostáticos, de acción sinérgica, rápida y prolongada, apropiados para el control de micoplasma y mantenimiento del tracto respiratorio limpio de agentes microbianos primarios o secundarios.

INDICACIONES

BRONCOX D® es eficaz contra infecciones en aves causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *M. sinoviae*, *M. meleagridis*, E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, clostridiosis. En porcinos, actúa frente a neumonía enzoótica, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium pyogenes*; *Erysipelothrix rhusiopathiae*, rinitis atrófica, disentería porcina y artritis por *Mycoplasma hyosynoviae* y *Staphylococcus* spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aves (pollos, pollitas de reemplazo, pavos) y porcinos vía oral.

- Agua de bebida: 100 mg de BRONCOX D®/kg p.v./día, por 3 a 5 días o 1 kg de BRONCOX D®/1000 L por 3 a 5 días (preparación diaria).

- Alimento: 2 kg de BRONCOX D®/T por 5 a 7 días



PERIODO DE RETIRO

Aves (pollos, gallinas y pavos): 5 días.

Porcinos: 14 días.


PRESENTACIÓN

Sobre por 10 g.

Bolsa por 100 g.

Bolsa por 1kg, 5 kg y 10 kg.

Sacos por 15 kg, 20 kg y 25 kg.



ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Proteger de la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 15°C y 30°C.

