

REGISTRO SENASA: F.03.20.N.1238

ANTIBIÓTICO

USO VETERINARIO

POLVO

COMPOSICIÓN

Sulfato de colistina.....75 g
Excipiente c.s.p.1000 g

COLISDROG®

PROPIEDADES

COLISDROG® está compuesto, principalmente, por sulfato de colistina (polimixina E), un antibiótico polipeptídico producido a partir de la fermentación del *Bacillus polymyxa* var. *colistinus*. Es de acción bactericida y afecta a una gran variedad de microorganismos Gram negativos (en división celular, o en latencia), alterando la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, lo cual conduce a la pérdida de moléculas intracelulares, provocando su muerte. Tiene la capacidad de unirse a endotoxinas bacterianas.

INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones digestivas causadas por bacterias como *Pseudomona aureginosa*, *E. coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp. y otras bacterias sensibles a la colistina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral en el agua de bebida:

Aves: 0.63 g de COLISDROG® / L / día, por 3 a 5 días.

Porcinos: 0.83 g de COLISDROG® / L / día, por 3 a 5 días.

Vía oral en el alimento balanceado:

Aves: 1.25 kg de COLISDROG® / T / día, por 3 a 5 días.

Porcinos: 1.67 kg de COLISDROG® / T / día, por 3 a 5 días.



PERIODO DE RETIRO

Pollos y gallinas: 1 día. **Pavos:** 7 días. **Huevos:** 0 días.

Porcinos: 1 día.


PRESENTACIÓN

Sobre por 10 g.

Bolsa por 100 g.

Bolsa por 1kg, 5 kg y 10 kg.

Sacos por 15 kg, 20 kg y 25 kg.



ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Proteger de la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 15°C y 30°C.

