

REGISTRO SENASA: F.03.04.N.0733

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

USO VETERINARIO

POLVO

**COMPOSICIÓN**

Doxiciclina HCl.....500 g  
Excipiente c.s.p.....1000 g

**DOXIDROG-50®**

**PROPIEDADES**

**DOXIDROG-50®** es un antibiótico de amplio espectro cuyo principio activo es la doxiciclina, una tetraciclina de última generación que a diferencia de otras tetraciclinas muestra una baja afinidad por los iones calcio. Esta característica minimiza el riesgo de producir resistencia cruzada con otros antibióticos. Muestra una rápida y muy completa absorción gastrointestinal, por lo que se reducen sus trastornos y el animal no sufre pérdidas de peso o merma en su desarrollo general.

**INDICACIONES**

**Aves:** Enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum* y complicada por la presencia de *Escherichia coli*. Casos de colibacilosis, sinovitis infecciosa, cólera y cresta azul.

**Bovinos, caprinos, ovinos y porcinos:** Neumonía bacteriana, septicemia hemorrágica, leptospirosis, anaplasmosis, piroplasmosis, enteritis, difteria, ántrax, prostatitis, brucelosis, pasteurelosis, carbunco sintomático, aborto enzoótico, infecciones del aparato genital, ehrlichiosis, erisipela, diarreas bacterianas, mastitis y metritis.

**ADMINISTRACIÓN Y DOSIS**

Vía oral según corresponda.

**Aves:**

- **Agua de bebida:** 0.4 g / L de agua, o 40 mg / kg p.v. / día, durante 3 a 5 días.
- **Alimento:** 800 g / T, durante 5 a 7 días.

**Bovinos, caprinos, ovinos y porcinos:**

- **Agua de bebida:** 0.2 g / L de agua, o 1 g / 50 kg p.v., durante 3 a 5 días.



**PERIODO DE RETIRO**

**Aves, bovinos, ovinos y caprinos:** 7 días.

**Porcinos:** 8 días.


No administrar en animales productores de huevo o leche para consumo humano.

**PRESENTACIÓN**

Sobre por 100 g.

Bolsa por 1 kg.

Saco por 20 kg.



**ALMACENAMIENTO**

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Proteger de la luz solar directa. Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 15 °C y 30 °C.

